

Glosario semiológico en Dermatología (XI)

Ester Avayú¹, Francisco Urbina², Margarita Enberg³

¹Dermatóloga CRS Cordillera Oriente Peñalolén, Clínica Indisa, Docente Universidad de Chile, Sede Oriente. ²Dermatólogo en práctica privada, Santiago. ³Médico Internista, centro médico MEDNOR, Antofagasta.

El glosario semiológico en Dermatología es la recopilación parcelada de una gran cantidad de lesiones, signos, epónimos, analogías y comparaciones con las que se describen los diversos procesos de nuestra especialidad.

Acné agminado: también denominado acnitis, es un trastorno raro de origen desconocido, caracterizado por pápulas rojizas suaves localizadas habitualmente alrededor de los ojos o de la boca, que evolucionan a la formación de cicatrices redondeadas. Denominada antiguamente como lupus miliar diseminado facial, representaría una sobreposición entre rosácea y dermatitis perioral, y se produciría por una reacción granulomatosa tras daño del folículo pilosebáceo.



Acné necrótico: de presentación infrecuente: afecta a varones mayores, muchas veces seborreicos. Se caracteriza por brotes de pápulas foliculares localizadas en los márgenes anteriores del cuero cabelludo, que evolucionan hacia la necrosis y formación de cicatrices varioliformes.



Cuello sucio atópico: pigmentación reticulada en la región anterolateral del cuello; se observa en la dermatitis atópica.



Cuello sucio: escamas adherentes de color marrón localizadas en pliegues y zonas de extensión. Se observa en la ictiosis ligada al cromosoma X. No se presenta en la ictiosis vulgar.

Cuello de violinista: placas liquenificadas con pápulas y pústulas situadas por debajo de la mandíbula, en la zona de apoyo del violín (Gentileza de la Dra. Ximena Ancic).




Disparos cutáneos: cicatrices atróficas que aparecen tras ulceraciones producidas por múltiples inyecciones subcutáneas de heroína.

Leuconiquia verdadera difusa: uña de color blanco opaco que no desaparece a la compresión. Se produce en enfermedades con alteraciones de la queratinización de la matriz ungueal distal. Puede ser hereditaria o asociarse a queratodermia, o a otros trastornos diversos, tales como colitis ulcerosa, cirrosis hepática y lepra.



Leuconiquia verdadera punctata y transversal: la variedad punteada se produce por traumatismos locales y la transversal por procedimientos de manicura o compresión por calzado no apropiado.



Placas mucosas: son lesiones de las mucosas características de la sífilis secundaria. Se presentan en las amígdalas, faringe, lengua, encías, labios o genitales, mayoritariamente en mujeres, en forma de lesiones redondeadas, maceradas y aplanadas.



Rágades: consisten en fisuras transversales en los ángulos de los labios. Su nombre deriva del griego, que significa hendidura, y luego a través del latín ragadía, que al español significa grieta.



Rágades sifilíticas: fisuras oblicuas profundas en las comisuras de los labios que se observan en el curso de una sífilis secundaria o congénita. A diferencia de la anterior, curan dejando cicatrices.

Signo del hoyuelo: si se comprime una lesión haciendo pinza con los dedos, ésta se desplaza hacia abajo. Se observa típicamente en el dermatofibroma.



Triángulo de Wilkinson: se observa en las dermatitis fotoalérgicas, en las que una zona triangular de las regiones retroauriculares -a las que no llega la radiación solar- no aparece afectada por el eccema.

